

藥物成分

劑型

櫃號

Diphenidol

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-162

☞ 藥品商品名及含量

世華妥糖衣錠 25 毫克/錠 (Cephendol)。

敵芬尼朵糖衣錠 25 毫克/錠 (Diphenidol)。

☞ 藥品作用

本藥可改善末梢血液循環，因內耳障礙引起之眩暈。

☞ 服用方式

1. 通常每天 3 次，每次 1 粒。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是無尿症、青光眼、肝腎功能不良。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。

3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

4. 常見副作用為口渴、口乾、暈眩、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、血壓短暫下降、視力模糊、虛弱、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚出疹/紅斑、神智混亂、幻覺、昏睡、暈眩、痙攣或休克。

6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。