



藥物成分	劑型	櫃號
Lanthanum Carbonate	咀嚼錠	
版本：TPE202309／檔號：2023-263		

☞ 藥品商品名及含量

福斯利諾咀嚼錠 750 公絲 (Fosrenol chewable tablet)

☞ 藥品作用

本藥可和磷結合後形成不溶解的合成物，阻止飲食內的磷在胃腸道被吸收，用來治療末期腎臟疾病患者之高磷酸血症。

☞ 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 隨餐或餐後立即服用。錠劑必須咬碎，不可整粒吞服，可將錠劑壓碎以幫助咀嚼。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是低磷酸鹽血症、曾患胃腸道阻塞、胃腸道潰瘍穿孔、胃腸道癌、接受胃腸相關手術、蠕動減緩的疾病(便秘、糖尿病性胃輕癱)、腹膜炎、潰瘍性結腸炎、克隆氏病或對水合碳酸矽或福斯利諾任一賦形劑過敏者的病人。
2. 若同時與甲狀腺製劑 levothyroxine、奎寧類藥物 chloroquine、hydroxychloroquine、抗黴菌藥 ketoconazole、四環黴素類抗生素 tetracycline、doxycycline 及 fluoroquinolone 類抗生素併用，應錯開 2 小時以上服用。
3. 常見的藥物副作用：腹瀉、噁心嘔吐、腹痛、便秘等，一般都不嚴重，但若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：洗腎用人工血管阻塞、皮膚癢、臉或嘴巴喉嚨腫脹、呼吸困難等過敏現象。

臺北市立

5. 懷孕等級 C，目前對胎兒的風險不明，臨床資料尚不足，不應於懷孕期間使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

6. 本藥尚不知是否會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。