



藥物成分

劑型

櫃號

Clopidogrel

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-556

☞ 藥品商品名及含量

舒栓寧山德士膜衣錠 75 毫克/錠 (Clopidogrel Sandoz F.C.)

保栓通膜衣錠 75 毫克/錠 (Plavix F.C.)

☞ 藥品作用

可用來降低中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的病人再發生粥狀動脈硬化事件的機率(可以降低如：心肌梗塞、中風或其他因血管病變引起死亡的機率)。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**消化道潰瘍**、**顱內出血**、**血友病**或**肝腎**方面病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他抗凝血藥物。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為為不明的出血，若皮膚出現小面積紫斑/瘀血、眼睛充血或關節血腫、腸胃不適、輕微皮疹，請回診時特別告知醫師，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚紅疹、蕁麻疹、呼吸或吞嚥困難、解黑便、聲音嘶啞、嘔血、嚴重不正常出血或大面積瘀青、鼻血不止、血尿、視覺喪失、發燒不退、眼睛或皮膚變黃。**
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應/臨床資料不足/有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已

臺北市立

聯合醫院

懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。