

藥物成分

劑型

櫃號

Sucralfate

口服藥

版本：TPE202309／流水號：2023-401

☞ 藥品商品名及含量

保胃懸乳液 1000 毫克/10 毫升/包 (Scrat)

☞ 藥品作用

治療胃潰瘍，藥品可附著於受傷的潰瘍組織，保護胃壁不受酸及酵素的破壞，幫助潰瘍處癒合。

☞ 服用方式

1. 通常一天服用三~四次，空腹服用效果較佳。建議用餐前一小時及睡前服用。
2. 若劑型為懸乳液，服用前請先搖勻。若為顆粒劑，直接配水服用即可。
3. 請依指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 曾經對此藥 Sucralfate 有過敏病史者禁止使用。
2. 本藥可能會影響某些藥物的吸收，請向醫師說明正在服用的藥物，並向藥師諮詢藥物交互作用之注意事項。
3. 常見副作用為便秘、腹痛及脹氣。為減少以上副作用，請攝取高纖食物(蔬菜、水果及麥麩)並喝足量的水。
4. 若有下列症狀，請立刻停藥並立即通知您的醫師：血便或黑便、咳出或嘔出鮮紅色或看似研磨咖啡樣的物質。
5. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。藥物分泌到母乳的量稀少，有哺乳需求請諮詢醫師或藥師。