



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Piracetam</b>	<b>口服溶 液顆粒</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-346		

## ☞ 藥品商品名及含量

**腦思坦內服溶液用顆粒劑 1200 毫克/包 (Hamgo Granules for Oral Solution)**

**郝智內服溶液用顆粒劑 1200 毫克/包 (Syntam Granules for Oral Solution)**

## ☞ 藥品作用

腦血管障礙及老化所引起的智力障礙、皮質性陣發性抽搐。

## ☞ 服用方式

1. 一般起始劑量為每日 1 次，每次 1-6 包。醫師會依病情調升維持劑量，並依劑量調整為每日分二至三次服用。
2. 開始以本藥治療後，必須持續服用直到症狀解除。當療程結束時，為避免突然復發，請依醫師指示逐漸調降劑量。
3. **請勿直接服用藥品顆粒**，使用前請先將袋內顆粒倒入約 50 毫升水中，溶解後服用。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺相關疾病、腦內出血病史、腎臟疾病、苯酮尿症及對 pyrrolidone 衍生物有過敏的病史。
2. 本藥含有阿斯巴甜，苯酮尿症患者不適合使用。
3. **因本藥會影響血小板凝集功能**，如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是甲狀腺素。

5. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 服藥期間請定期監控腎功能。
7. 常見副作用為體重增加、眩暈、噁心嘔吐、腹痛腹瀉、頭痛、嗜睡、焦慮，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀 請立刻就醫：運動機能亢進、血管神經性水腫、過敏反應（皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛）。
9. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。