



藥物成分	劑型	櫃號
Oxethazaine/ Polymigel	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-400		

☞ 藥品商品名及含量

息痛佳音錠 <Strocain (Polymigel + Oxethazaine 5mg) >

☞ 藥品作用

可用於急性、慢性胃炎所引起的胃痛、噁心、胃灼熱以及胃部不快感。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3~4 次，每次 1~2 錠。
2. 吞服時不要咬碎或咀嚼，以避免殘留口中產生麻木感。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**腎衰竭病患**。
2. 常見的副作用有食慾不振，口渴，噁心、便秘、頭痛、思睡等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料顯示沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。