



## 藥物成分

**Picosulfate/  
Citric Acid/  
MgO**

## 劑型

**口服  
粉劑**

## 櫃號

版本：TPE202309 / 檔號：2023-340

### ☞ 藥品商品名及含量

保可淨散劑 16.2 克/包 (Bowklean Powder)

澄易見散劑 16.2 克/包 (Drinklear Powder)

### ☞ 藥品作用

作為成人大腸鏡檢查前之清腸劑。

### ☞ 服用方式

1. 檢查或手術前請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數，亦不可事先泡好溶液備用。

2. 每次臨用前，將每包粉劑以 150 毫升常溫冷水泡製，攪拌至少 5 分鐘，隨著粉末溶解，溶液溫度可能略為上升。

3. 每份產品內含有兩包粉劑，建議兩劑分開時間服用，且不可直接服用，應溶於水中服用。

(1) 第一劑：進行大腸鏡檢查前一天晚上(如下午 5 點至晚上 9 點)，服藥後 5 小時內，補充 250 毫升澄清流質飲品至少 5 次。

(2) 第二劑：進行大腸鏡檢查當天，在檢查前 5 小時左右服用完畢，並在檢查前 2 小時之前，補充 250 毫升澄清流質飲品至少 3 次。

### ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有其他疾病，特別是腸胃道阻塞、大腸黏膜潰瘍、胃滯留、缺血性大腸炎、潰瘍性大腸炎、腎臟疾病、癲癇、心律不整等情況。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素及會造成體液或電解質變化的藥物。

3. 本藥成分含有鎂離子，與四環黴素及 fluoroquinolone 類抗

生素、鐵、digoxin、chlorpromazine 與 penicillamine 合併使用時，為避免與鎂離子螯合，必須在使用本藥前至少 2 小時，或是使用後至少 6 小時，才能服用前述藥品。

4. 其他口服藥須於服用本藥前 1 小時服用。
5. 使用本藥前 2 小時以流體食物(如：茶、咖啡、運動飲料、無渣果汁及清湯)為主，禁止服用牛奶、豆漿及固體食物。
6. 檢查前三天請務必進行低渣飲食(如：白吐司、稀飯、麵條)，避免吃高纖蔬菜、水果、肉類、奶製品(如：牛奶、羊奶、奶酪、優酪乳)。
7. 服用第一劑後如果發生嚴重脹氣、腹脹或腹痛時，必須等到症狀緩解後再服用第二劑。
8. 常見副作用為噁心、頭痛、嘔吐、頭暈與腹痛/絞痛，但不包括脹氣、腹脹及不需處置的水瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診
9. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。