



藥物成分	劑型	櫃號
Darunavir /Cobicistat	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-139		

☞ 藥品商品名及含量

普澤力 800 毫克/150 毫克/膜衣錠(Prezcobix)

☞ 藥品作用

適用於與其他抗反轉錄病毒藥物併用，以治療未曾接受治療及曾經接受治療且未發生darunavir抗藥性相關取代(V11I、V32I、L33F、I47V、I50V、I54L、I54M、T74P、L76V、I84V、L89V)的人類免疫缺乏病毒(HIV-1)感染之成人患者。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日一次，隨餐服用一錠。
2. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。

☞ 注意事項

1. 不建議用於重度腎功能不全、重度肝功能不全的病人。
2. 不建議用於3歲以下的兒童病人
3. Prezcobix 可能會與許多藥物發生交互作用。若有使用任何其他處方藥或非處方藥或草藥產品，請於就診時務必先告知醫師，您正在服用的所有藥物。
4. 可能引起的嚴重不良反應如下：肝毒性、嚴重皮膚反應、對血清肌酸酐的影響，與tenofovir DF併用時新發生或更加惡化的腎功能損害現象。如有發生，應立即停止使用，請洽醫師診治。
5. 懷孕等級 C。女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。