



藥物成分	劑型	櫃號
Flunitrazepam	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-597		

☞ 藥品商品名及含量

復爾靜錠 2 毫克/錠 (Fluzepam)

美得眠錠 2 毫克/錠 (Modipanol)

☞ 藥品作用

本藥品可用來減緩焦慮，亦可作為安眠、癲癇或肌肉痙攣之治療。

☞ 服用方式

1. 請遵照處方使用，通常每日睡前 1 次，勿自行增加藥量、服藥次數或服藥日數。
2. 如果連續服用一段期間之後請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(焦慮、睡不著、易怒)，如有問題請洽詢藥師或醫師。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對苯二氮平類安眠藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、重肌無力症、嚴重呼吸功能不足、支氣管氣喘、急性腦血管障礙、衰弱、高齡、癲癇、心、肝、腎障礙、腦功能障礙。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴比妥類藥物、鴉片類藥物、抗黴菌藥品、苯二氮平拮抗劑 flumazenil、中樞神經抑制劑、單胺氧化酶抑制劑。
3. **本藥可能會讓人覺得嗜睡、警覺性及協調能力降低，在沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。

5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 服藥期間可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。
7. 突然停藥易出現戒斷症狀，如：不安、失眠、盜汗、顫抖等。
8. 常見副作用為虛弱、頭暈、嗜睡、不穩、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
9. **如果有下列症狀，請立刻就醫：話多、不安、焦慮、亢奮、發抖、肌肉痙攣、意識不清、癲癇、皮膚或眼球變黃。**
10. 懷孕期間使用苯二氮平類有可能提高胎兒的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
11. 本藥可能會分泌到母乳裡，若有使用本藥請停止哺乳。