

藥物成分

劑型

櫃號

Butenafine HCl 外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-079

☞ 藥品商品名及含量

"培力"止黴寧乳膏 1% (Bunafine Cream 1%)

優達癬乳膏 1% (Udaxen cream 1%)

☞ 藥品作用

本藥用於治療指(趾)間黴菌病(香港腳)、體癬、股癬等皮膚真菌數黴菌引起的皮膚感染。

☞ 使用方式

以少量藥膏塗抹於患部，輕輕摩擦使藥劑披覆於皮膚表面。藥品使用頻次請遵照醫囑使用。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 butenafine 有過敏之患者、或曾對抗黴菌藥物(如:allylamine)過敏者應審慎使用，避免交叉反應產生。
2. 本品與其它藥品交互作用的資料尚未評估，若有同時使用其它藥品請告知醫師。
3. 在患部使用藥膏後，雙手應予洗淨，避免接觸到眼睛、鼻子、嘴巴等處之黏膜。
4. 本藥品僅供外用，如使用後有刺激現象或過敏反應，應立即停止用藥，並盡快回診聯絡您的醫生。
5. 使用藥品治療後，即使您的症候已經改善，仍需遵循醫師的治療程序，切勿自行停藥。
6. 常見副作用為接觸性皮膚炎、紅腫、發癢及刺激，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 懷孕等級 B 級，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。