



藥物成分

劑型

櫃號

Gabapentin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-608

☞ 藥品商品名及含量

鎮頑癲 300 毫克/膠囊 (Neurontin)

康平癲 300 毫克/膠囊 (Gapatin)

☞ 藥品作用

本藥主要治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法、帶狀疱疹後神經痛。

☞ 服用方式

1. 通常一日 3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 與制酸劑併服，需間隔兩小時以上。
4. **本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 常見副作用為嗜眠、暈眩、運動失調、倦怠、眼球震顫，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀 請立刻就醫：呼吸困難、唇、喉嚨和舌頭腫脹以及需要緊急治療的低血壓。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。