



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Cabozantinib (s)-malate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-084		

## ☞ 藥品商品名及含量

**癌必定膜衣錠 60 毫克/錠 (Cabometyx film-coated tablet)**

## ☞ 藥品作用

適用於腎細胞癌、肝細胞癌以及分化型甲狀腺癌。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量為 60 mg 每日一次，實際用法請以醫師指示為準。錠劑應**整粒吞服**，不可將此錠劑粉碎。
2. **不可和食物同時服用**，給藥時間應於進食前至少 1 小時或進食後至少 2 小時。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若**距離下次給藥 12 小時內**，不可補漏掉的劑量，在下次用藥時間服藥即可。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是最近曾有**出血病史**(包括咯血、吐血及黑便)、腸胃穿孔、心血管疾病、高血壓與動脈瘤病史、甲狀腺功能異常、**肝功能不全**病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 warfarin、itraconazole、ketoconazole、rifampin。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚/葡萄柚汁、聖約翰草(St. John's Wort)。
4. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥，因為安排進行外科手術(包括牙科手術)前至少 28 天應停用本藥品。
5. 常見副作用包括腹瀉、便秘、噁心、嘔吐、肌肉及骨骼痠痛、疲倦和皮疹，若無法忍受或出現其他不良反應，請回診並告知醫師。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不尋常嚴重流血或出血之徵兆、癲癇、意識/精神混亂、血壓控制不佳時。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎或死亡的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間及**最後一劑給藥後 4 個月內**不建議哺乳。