



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Candesartan cilexetil</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-096		

## ☞ 藥品商品名及含量

博脈舒錠 8 公絲/錠 (Blopess Tablet)

康舒坦錠 8 毫克/錠 (Candesartan Mylan)

## ☞ 藥品作用

單獨或與其他藥品合併使用於高血壓及心衰竭。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。

2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝功能不全或膽汁鬱滯。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血壓藥 aliskiren、保鉀利尿劑、鉀補充劑、含鉀離子之代鹽或其他可能增加血液鉀值的藥物 (如：heparin)。

3. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。並建議定期監測血鉀值。

4. 常見副作用為低血壓、上呼吸道感染、暈眩、背痛、鼻炎、咽炎等，但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(如紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、腎功能異常症狀(排尿困難、尿量急劇減少、尿中帶血)、心跳異常、頭重腳輕。

6. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師。