

藥物成分	劑型	櫃號
<p>Bictegravir sodium/ Emtricitabine/ Tenofovir alafenamide</p>	<p>口服藥</p>	
<p>版本：TPE202309 / 檔號：2023-058</p>		

☞ 藥品商品名及含量

吉他韋膜衣錠 (Biktarvy Tablets)

☞ 藥品作用

Biktarvy 是一種抗愛滋病毒複方口服藥，用於治療感染第一型人類免疫缺乏病毒(HIV-1)的成年患者。本藥品可抑制病毒複製，減緩疾病進展，但不能治癒HIV或AIDS。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，建議於固定時間服藥，可與食物併服或不併服。
2. 不能整粒一次吞服的兒童可以將藥錠剝成兩半，並在約 10 分鐘內分別服用完畢。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 bictegravir、emtricitabine、tenofovir alafenamide 有過敏反應，或是肝腎功能不全、B 型肝炎等疾病。
2. 某些藥品可能會影響 Biktarvy 作用，請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥品，特別是抗心律不整藥 dofetilide、抗結核藥 rifampin、抗癲癇藥、聖約翰草。
3. 服用本藥品時，請間隔含鋁或鎂的制酸劑、含鈣或鐵的補充劑之前至少 2 小時或之後至少 6 小時。
4. 請勿在未經醫生確認的情況下停止服用 Biktarvy。不規律

用藥、短暫停藥可能使病毒產生抗藥性而更難治療。

5. 當藥即將吃完時，請盡早回診，避免療程中斷。
6. 常見副作用為腹瀉、噁心、頭痛、疲倦、異常作夢、暈眩、嘔吐、消化不良、皮疹，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**過敏反應**(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、**乳酸中毒**(呼吸急促、昏睡、酸痛、全身不適、畏寒、眩暈)
8. Biktarvy 對於懷孕婦女與胎兒的影響目前尚未確定，但資料顯示動物實驗中沒有不良發育的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. Biktarvy 或其個別成分是否會出現於人類的乳汁中、影響人類乳汁分泌目前尚未確定，但 HIV 病毒可透過乳汁傳染，故不建議感染 HIV-1 的母親進行哺乳。