

藥物成分

劑型

櫃號

Metronidazole

外用藥膏

版本：TPE202309 / 檔號：2023-296

## ☞ 藥品商品名及含量

素女潔陰道用凝膠 7.5 毫克/克 (SUTROL GEL-VAGINAL)

## ☞ 藥品作用

治療細菌陰道炎。

## ☞ 使用方式

1. 建議劑量為一次 5 克，一天一次或兩次塗於陰道內，連續 5 天，若一天一次使用者，應於就寢時使用。
2. 請依照醫師指示使用完整個療程，不可自行調整劑量或增加用藥次數，即使是症狀已改善或月經期間也不應中斷。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。
3. 使用步驟
  - (1) 取鋁管外蓋的尖端刺破鋁管封口。
  - (2) 將施藥器旋上鋁管口。
  - (3) 拉開施藥器之壓縮管，再將凝膠輕擠入施藥器內，直至施藥器全滿為止。
  - (4) 採舒適坐姿或仰臥，握住施藥器外管輕塞入陰道深處。
  - (5) 輕推壓縮管導入凝膠至使用完畢後取出。
  - (6) 將壓縮管與外管分離後，以溫水清洗陰乾。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因口服 metronidazole 引起過敏現象。
2. 限陰道用，避免與眼睛、鼻子或嘴巴接觸。萬一接觸時，請用大量冷水清洗。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物造成急性精神病或混亂狀態的風險。若需因用酒精，需停藥一天以上才可以。

臺北市立

4. 常見副作用為陰道刺激、腸胃不適、頭痛、噁心、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：陰道念珠菌病徵(白帶、搔癢、外因發炎紅腫或尿道灼熱疼痛)。
6. 治療時不可用刺激性肥皂清洗，且應避免性行為以避免交叉感染。