



藥物成分

劑型

櫃號

Memantine

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-664

## ☞ 藥品商品名及含量

威智滴劑 10 毫克/毫升 (Witgen oral drop)

## ☞ 藥品作用

治療中重度及重度阿滋海默症。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 第一週為每日一次，每次 0.5 ml；第二週建議為每日二次，每次 0.5 ml；第三週建議每日二次，每日 1.5 ml；第四週起建議每日二次，每次 1 ml。
2. 藥水可隨餐或空腹服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、心血管疾病、泌尿道感染、嚴重腎功能障礙。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是碳酸酐酶抑制劑和 NMDA 受體拮抗劑 (amantadine, dextromethorphan)。
3. 請提前告知醫師如果您是素食者或計畫轉為素食、純植物性飲食者因這類飲食容易造成血中藥物濃度上升。
4. 本藥可能會讓人暈眩及注意力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為眩暈、頭痛、精神混亂、便秘、噁心嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 目前尚未有藥品用於孕婦之臨床資料，若醫師經評估患者後研判使用之效益大於風險，經充分告知且病人同意下可



7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。