

藥物成分

劑型

櫃號

Potassium Citrate

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-356

☞ 藥品商品名及含量

去石寧錠 540 毫克/錠 (Destone)

☞ 藥品作用

利用鹼化尿液減少結石的形成，用於治療腎結石。每一錠相當於5毫當量的檸檬酸鉀。

☞ 服用方式

1. 本藥每日劑量需根據臨床反應做出個人化調整，請遵照醫師指示調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是活動性尿路感染、消化性潰瘍、腎功能不全、高血鉀症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是留鉀性利尿劑(spironolactone、triamterene、amiloride)或其他含鉀之製劑。
3. 應配合食鹽攝取的限制及攝取足量的液體，建議每日的尿量至少有 2 公升。
4. 服藥期間，請定期監控電解質、腎功能、血球數。
5. 常見副作用為輕微腸胃不適，如腹痛、噁心、嘔吐或輕瀉，建議服用大量水、隨餐或餐後服用藥物，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀 請立刻就醫：嚴重嘔吐、腹痛或胃腸出血。
7. 女性哺乳、計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。