

藥物成分

劑型

櫃號

Timolol

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-424

☞ 藥品商品名及含量

青眼露長效型 0.5%點眼液劑 2.5 毫升/瓶 (Timoptol XE)

☞ 藥品作用

治療青光眼。

☞ 使用方式

1. 通常每日1次，每次1滴於病眼。
2. 每次使用前將瓶子反轉振搖一次。
3. 使用眼藥水前，須洗淨雙手。在打開藥品的外蓋後，應注意不可讓瓶口碰觸到任何物品與身體任何部位。
4. 點藥水時，將下眼皮輕輕拉開，將藥水滴入下眼瞼與眼睛之間，不要直接滴在眼球上。
5. 點完藥水後應閉上眼睛並壓住兩側鼻淚管2分鐘，減少全身性副作用。
6. 閉眼後可輕輕轉動眼球，使藥水能夠均勻分散到眼球表面，接著繼續閉眼休息約五分鐘。
7. 若欲併用其他眼用製劑，應先使用其他製劑，10分鐘後再使用本藥品。
8. 若有佩戴隱形眼鏡，應先取下隱形眼鏡再使用眼藥水。若點完眼藥水還須佩戴隱形眼鏡，應在點完眼藥水 15 分鐘後再配戴。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是氣喘、慢性阻塞性肺病、心臟疾病。
2. 常見副作用為暫時性視力模糊、頭痛、眼睛有灼熱搔癢刺痛感、結膜或眼瞼充血，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或眼部周圍脹痛)。

4. 目前對人類胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，故女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

∞ 保存

眼藥水開封後應置於室內陰涼處，避免冷凍。開封一個月後無論是否冷藏均不建議繼續使用(藥水外盒所標示之保存期限為沒有開封下的保存期限)。