



藥物成分	劑型	櫃號
Rotavirus Vaccine	口服液	
版本：TPE202309／櫃號：2023-383		

☞ 藥品商品名及含量

羅特律輪狀病毒疫苗口服懸液劑 1.5 毫升/劑 (Rotarix)

☞ 藥品作用

用於預防輪狀病毒所引起的腸胃炎。

☞ 服用方式

1. 僅供口服使用。

2. 完整的疫苗接種時程共須接種兩劑，第一劑可在出生滿 6 週後投予，兩劑間隔不得少於 4 週，最遲必須在出生後 24 週內完成。建議最好在出生後 16 週內完成接種。

3. 移除口服給藥器的保護頂蓋，讓嬰兒以斜靠姿勢坐好，向著嬰兒臉頰內側，將液劑緩緩擠入嬰兒口中。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸套疊病史、未經矯正的胃腸道畸形、疑似免疫功能缺陷、急性嚴重發燒性的疾病、腹瀉嘔吐。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。

3. 在接種疫苗之前或之後，嬰兒飲食無任何限制。

4. 和下列疫苗可同時接種：六合一疫苗、白喉-破傷風-全細胞百日咳疫苗、白喉-破傷風-非細胞性百日咳疫苗、b 型嗜血桿菌疫苗、不活化小兒麻痺疫苗、B 型肝炎疫苗、肺炎鏈球菌結合型疫苗及 C 型腦膜炎球菌結合型疫苗。

5. 小兒麻痺口服疫苗與本項輪狀病毒疫苗應間隔兩週。

6. 常見副作用為腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：腸套疊(腹痛、嘔吐、血便)。