

藥物成分

劑型

櫃號

**Acetaminophen/
Carisoprodol**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-507

☞ 藥品商品名及含量

如來舒膠囊 350 毫克+175 毫克/膠囊(Relax)

肌力康錠 350 毫克+175 毫克/錠(Kolax)

☞ 藥品作用

Carisoprodol 所產生之骨骼肌鬆弛作用，可以改善骨骼肌之緊張力及運動不正常的現象。Acetaminophen 能迅速抑制大腦興奮引起之痛覺，使中樞對疼痛之感覺遲鈍，亦會干擾下視丘與大腦皮質間痛覺衝動的傳遞，因而改變痛覺的反應，對中樞神經產生選擇性及有限制性的鎮痛作用。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3-4 次，每次 1-2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者應避免重複使用。
2. 不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
3. 常見副作用為嗜睡、頭昏等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列過敏症狀，請立刻停藥就醫：皮疹，蕁麻疹，瘙癢，皮膚紅腫，起水泡或脫皮；臉、嘴唇、舌頭或喉嚨發生腫脹，胸悶、呼吸困難。

臺北市立

5. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到
母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。