



藥物成分	劑型	櫃號
Emtricitabine +Tenofovir Disoproxil Fumarate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-769		

☞ 藥品商品名及含量

舒發泰膜衣錠 200 毫克/300 毫克/錠 (Truvada F.C.)

得諾恩膜衣錠 200 毫克/300 毫克/錠 (Tenoem F.C.)

☞ 藥品作用

1. 治療：可合併其他抗病毒藥物治療病毒感染。
2. 預防：可用於高風險族群於暴露前預防性投藥。

☞ 服用方式

1. 治療：每日 1 次，每次 1 粒，需每日固定時間服用。
2. 預防：若用於暴露前預防性投藥，有兩種使用方式
 - (1) 每日 1 次，每次 1 粒，需每日固定時間服用。
 - (2) 依需要使用：每次性行為前 2-24 小時前使用 2 粒，服藥後每隔 24 小時服用 1 粒，直到最後一次性行為後 2 日為止，用於預防建議請詢問您的醫師或藥師。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服(小於 12 小時)，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 B 型肝炎疾病、肝腎功能不良、骨質疏鬆症或曾有骨折。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如：抗病毒藥物 atazanavir、adefovir、lamivudine，以及非類固醇類抗發炎藥物。

3. 若您服用本藥作為預防性投藥，有以下症狀請立刻就醫：

類流感症狀(發燒、頭痛、疲倦、關節痛、嘔吐、肌痛、咽喉炎、紅疹、夜間盜汗、頸淋巴結或腹股溝腺病變)。
若用於預防，需確認本身無此病毒感染。

4. 常見副作用為皮疹、疲倦、失眠、多夢、抑鬱、噁心、腹瀉、眩暈、頭痛、脂肪重分布，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：乳酸性酸中毒、肝腫大或肝毒性(皮膚或眼白變黃、嚴重腹痛、肌肉抽搐、茶色尿、灰白色便、異常疲倦)、臉部或喉頭紅腫、搔癢、呼吸困難、胸悶、發燒、皮膚呈紫黑色、喘鳴。

6. 女性計畫懷孕或已懷孕或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。本藥會分泌到母乳裡，哺乳前請務必諮詢您的醫師。