



藥物成分	劑型	櫃號
Chlorpromazine HCl	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-114		

☞ 藥品商品名及含量

穩舒眠膜衣錠 50 毫克/錠 (Winsumin F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為精神神經安定劑，可用於躁動、噁心、嘔吐、或具攻擊性與破壞性之行為障礙，也可用於持續打嗝的情況。

☞ 服用方式

1. 請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 服用本藥一小時內不可服用制酸劑或瀉劑，會減少藥品吸收。
2. 可與食物、牛乳或水共服，減低對胃之刺激。
3. 若有骨髓抑制、心血管疾病、青光眼、肝功能障礙、巴金森氏症、消化性潰瘍、前列腺肥大、尿滯留等疾病，請告知醫師。
4. 若正在服用抗癲癇藥、鋰鹽、利尿劑、抗凝血藥物等，請告知醫師/藥師。
5. 服用本藥尿液顏色可能改變，不需驚慌。
6. 本藥可能會讓人嗜睡、警覺性及協調能力降低，服用期間請勿開車或操作危險機械。
7. 服藥期間不可飲酒，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
8. 服藥期間避免抽菸，會影響藥品吸收。

9. 目前已知會對胎兒造成風險，女性計畫懷孕或已懷孕禁止使用本藥。

10. 本藥會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。