

藥物成分

劑型

櫃號

Sucralfate

口服藥

版本:TPE202309/流水號:2023-402

80 藥品作用

治療潰瘍性疾病,可附著於受傷的潰瘍組織,保護胃壁不受酸及酵素的破壞,幫助潰瘍處癒合。

80 服用方式

- 1. 通常一天服用三~四次,依年龄症狀增減,空腹服用效果 較佳。建議用餐前一小時及睡前服用。
- 2. 若劑型為懸乳液,服用前請先搖勻。若為顆粒劑,直接配水服用即可。
- 3. 請依指示服藥,不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘 記服藥,請立即補服,但若已接近下一次服藥,在下次用 藥時間服藥即可,不可為了補吃而服用雙倍劑量。

知 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是對 Sucralfate 有過敏病史者禁止使用。
- 2. 本藥可能會影響某些藥物的吸收,請向醫師說明正在服用 的藥物,並向藥師諮詢藥物交互作用之注意事項。
- 3. 常見副作用為便秘、口渴及噁心等,但一般都不嚴重,若 症狀惡化且無法忍受請回診。
- 4. 接受人工透析療法及缺乏磷酸鹽的患者請配合醫囑謹慎 使用藥物。
- 女性有計畫懷孕或已懷孕請告知醫師;藥物分泌到母乳的量不清楚,有哺乳需求請諮詢醫師或藥師。