



藥物成分

劑型

櫃號

Desmopressin

口溶錠/
口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-144

☞ 藥品商品名及含量

迷你寧凍晶口溶錠 60 微克/錠 (Minirin Melt 60 μ g)

迷你寧錠 0.1 毫克/錠 (Minirin Tablets 0.1mg)

沛卜淨錠 0.1 毫克/錠 (PMS-Desmopressin Tablets 0.1mg)

☞ 藥品作用

1. 中樞性尿崩症
2. 原發性夜尿症(限用於 6 歲以上病人)
3. 成人因夜間多尿所導致之夜尿症，即夜間尿液的產量超過膀胱的容量。

☞ 服用方式

1. 常用劑量：

- 中樞性尿崩症：通常一日 3 次，每次 1~2 粒
- 原發性夜尿症：通常睡前 1 次，每次 2 粒。
- 夜尿症：通常睡前 1 次，每次 1 粒。

2. 服用口溶錠時，放在舌下溶解即可，不須喝水。

3. 凍晶口溶錠是易碎的，可能被壓碎，所以不可加壓於鋁箔片上。

4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 desmopressin 引起過敏、習慣性或精神性之口渴症、已知或懷疑有心功能不全的病史和其他健康狀態需要用利尿劑者、中度至重度腎功能不全(C₁cr 低於 50mL/min)、低血鈉症、抗利尿激素不當分泌症候群

(SIADH)。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**糖皮質類固醇**、**環利尿劑**、**三環抗憂鬱劑(TCAs)**、**選擇性的血清素再吸收抑制劑(SSRIs)**、chlorpromazine、carbamazepine、sulfonylurea 類降血糖藥物(特別是 chlorpropamide 合併使用時)、NSAID 類消炎止痛藥、loperamide。
3. **血鈉監測**：建議在開始治療或增加劑量後 7 天內和約 1 個月內進行監測。65 歲或以上患者、低鈉血症的高風險患者以及使用可能導致水份滯留或增加低鈉血症風險的合併藥物患者應增加監測頻率。
4. **液體攝取限制**：治療原發性夜遺尿和夜尿時，強烈建議在服藥前 1 小時到服藥後 8 小時間將液體的攝取限量到最低。
5. 常見副作用為口乾、頭痛、疲勞、頭暈及腸胃道不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、**低血鈉症**(頭痛、腹痛、噁心、嘔吐、體重增加、頭暈、混亂、全身乏力、抽搐、昏迷等)。
7. 若有因液體或電解質不平衡所引起急性併發症的症狀(如全身性的感染，發燒，腸胃炎)時，應立即中斷治療，且須注意病人顱內壓升高的危險。
8. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

∞ 藥品儲存

不可超過 25°C。保存在原始包裝中防止受潮及避光。