



藥物成分

劑型

櫃號

Clobetasol

外用液

版本：TPE202309 / 檔號：2023-553

☞ 藥品商品名及含量

可易適泡沫液 0.5 毫克/克 25 毫升 (Vimax Foaming Solution)

☞ 藥品作用


可用於治療牛皮癬、濕疹、扁平苔蘚、盤狀紅斑性狼瘡。

☞ 使用方式

1. 每日 1~2 次，輕擦於患部。情況改善後即應停止用藥。
2. 治療超過四週後若未再複診則應停止治療。

使用步驟：

使用時請握鋁罐，垂直倒立 90 度，按下噴嘴即可順利擠出泡沫慕絲。錯誤握罐方式會讓瓶內氣體外洩，使用一段時間後就無法擠出慕絲。



- (1) 擠出：本劑使用前不須搖晃，使用時請直接垂直倒立瓶身擠出泡沫液即可。
- (2) 塗抹：請將本劑擠在杯蓋內，再用手指頭挖取適量泡沫液塗抹在患處使用。請切勿將泡沫液直接擠在患處使用，以避免藥物過量產生。
- (3) 乾燥：塗抹完請清洗雙手，未用完泡沫建議丟棄，患部不須再沖洗。

☞ 注意事項

1. 若患部發生感染，則應使用適當抗黴菌療法，如有任何廣

泛性感染應停止使用本劑。

2. 封閉包紮會形成溫濕的環境而促使產生細菌感染，故包紮前須先將皮膚清洗乾淨。
3. 長期大量使用於廣泛部位可能造成全身性吸收，造成腎上腺皮質機能亢進現象。
4. 常見副作用皮膚變薄、產生皺紋及表皮血管的擴張，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 若用於孩童，建議應每週複診由醫師確認後再延續使用。
6. 此藥用於孕婦及哺乳婦女的安全性仍未確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

∞ 保存方式

1. 請置於 25°C 以下陰涼處儲存，勿放在日曬處、浴室、廚房、汽車內等高溫處所。也不可長期放在冰箱，低溫會使內容物油水分離並堵塞噴嘴。
2. 當內容物快用完時，擠出的泡沫液會呈不完整斷續狀，但罐內仍有殘留的液化氣體，請按壓噴嘴排空氣體，空罐可交由垃圾車回收。