

藥物成分

劑型

櫃號

Dihydroergotamine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-155

☞ 藥品商品名及含量

樂息痛膠囊 5 毫克/膠囊 (Lesiton)。

☞ 藥品作用

本藥可用於治療偏頭痛及姿勢性低血壓。

☞ 服用方式

1. 通常一天 2 粒膠囊，早晚各口服 1 粒。
2. 於用餐時間服用，宜與較多量的水整粒吞服。不建議空腹服用，空腹服用可能引起噁心的副作用。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是麥角鹼過敏、末梢血液循環不良、冠狀動脈疾病、動脈炎、肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他血管收縮劑、巨環類抗生素、抗愛滋病毒藥物或 azole 類抗黴菌藥。
3. 服藥期間建議避免大量吸菸，以免增強血管收縮的作用。
4. 常見副作用為暈眩、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、心搏變快或變慢、四肢麻木或肌痛、虛弱，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：持續胸悶或胸痛、低血壓、四肢感覺異常、皮膚出疹/紅斑、呼吸困難、神智混亂、昏睡、暈眩、痙攣或休克。
6. 懷孕等級 X，孕婦及哺乳婦禁止使用，女性計畫懷孕或

臺北市立聯合醫院
哺乳請事先告知醫師。

