



藥物成分	劑型	櫃號
Tolperisone HCl	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-429		

☞ 藥品商品名及含量

泰樂欣膜衣錠 150 毫克/錠(Tolesin)

肌鬆定膜衣錠 150 毫克/錠(Topee)

☞ 藥品作用

反覆發生的疼痛性肌痙攣及腦部血管病變所導致之肌張力異常升高。

☞ 服用方式

1. 通常每日三次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏。
2. 常見副作用為無力、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏性反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、灼熱感或四肢疼痛。
4. 目前對人類胎兒的風險不明，且資料顯示動物實驗中無致畸胎的紀錄，但女性計畫懷孕或已懷孕前三個月內請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。