



藥物成分

劑型

櫃號

Telmisartan

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-766

☞ 藥品商品名及含量

必康平錠 40 毫克/錠 (Micardis)

必康平錠 80 毫克/錠 (Micardis)

泰米心平錠 40 毫克/錠 (Telcard)

泰米心平錠 80 毫克/錠 (Telcard)

☞ 藥品作用

本藥為血管收縮素 II 受體拮抗劑，用來治療原發性高血壓和降低心血管風險。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 本藥易受潮，藥品請保存於鋁箔包裝內，用前才由包裝內剝出，有需要分裝也請連同鋁箔包剪好。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是膽道阻塞性疾病、肝功能不全、腎功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是糖尿病或腎功能不全患者，且正在服用降血壓藥 aliskiren；其他降血壓劑、保鉀利尿劑、鉀離子補充劑、digoxin、鋰鹽、麻黃、非類固醇抗發炎止痛藥。
3. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。
4. 常見副作用為頭痛、頭暈、疲倦、咳嗽、噁心，少見發生姿勢性低血壓(坐臥姿變換站姿時易頭暈)，一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。

臺北市立

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促、過敏反應(搔癢、蕁麻疹、喉頭腫脹)、水腫、排尿量改變。

6. 本藥有造成胎兒不良影響的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。