



藥物成分

劑型

櫃號

Mirtazapine

口溶錠

版本：TPE202309 / 檔號：2023-302

## ☞ 藥品商品名及含量

美妥平口溶錠 30 毫克/錠 (Mirtapine O.D. tab)

鴻汶緩憂口溶錠 30 毫克/錠 (Apa-Mirtazapine O.D. tab)

## ☞ 藥品作用

治療憂鬱症。

## ☞ 服用方式

1. 通常起始劑量為每日 15 或 30 毫克，且晚上服用較高劑量，之後依據症狀控制情形調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是苯酮尿症，因為本藥含有阿斯巴甜。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，使用本藥前後二星期內不可同時使用單胺氧化酶抑制劑，可能會發生血清素樣症狀。避免併用鎮靜劑，本藥可能會增加 benzodiazepines 及其他鎮靜劑的鎮靜作用。避免飲用酒類，此藥會增強酒精的中樞抑制作用。
3. 本藥可能會讓人警覺性及注意力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為嗜睡、鎮靜、口乾、體重增加、食慾增加、頭暈與疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：自殺的念頭、行為異常。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。