



藥物成分	劑型	櫃號
Tipiracil HCL / Trifluridine	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-438		

☞ 藥品商品名及含量

朗斯弗膜衣錠 15 毫克/錠 (Lonsurf)

朗斯弗膜衣錠 20 毫克/錠 (Lonsurf)

☞ 藥品作用

本藥為一種選擇性的細胞生長抑制劑，用來治療食道癌、胃癌及大腸直腸癌。

☞ 服用方式

1. 通常每天 2 次，於每一週期的第 1-5 天及 8-12 天早晚飯後服用(一個週期為 28 天)，劑量則依療程而有所不同。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中重度腎功能不全患者。
2. 可能的藥物副作用：貧血、白血球低下、血小板低下、發燒、腹痛、降低食慾、噁心嘔吐、暈眩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是以下抗腫瘤劑(capecitabine, tegafur, doxifluridine, fluorouracil)
4. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有傷害胎兒的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。