

藥物成分

劑型

櫃號

**Iron(III)-Hydroxide
Polymaltose**

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-245

☞ 藥品商品名及含量

富鐵好滴劑 50 毫克/毫升 30 毫升 (Ferrum Hausmann Drops)

☞ 藥品作用

治療缺鐵性貧血及鐵質缺乏症。

☞ 服用方式

1. 投予劑量和治療療程視鐵缺乏嚴重度與年齡而定。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血色沉著病、血鐵質沉著症者。
2. 另外鐵質利用失常者(例如鉛中毒性貧血、鐵質利用不良性貧血、地中海型貧血)以及非鐵缺乏症引起的貧血(例如溶血性貧血、維生素 B12 缺乏引起的巨紅血球行貧血)皆不可使用。
3. 富鐵好滴劑須在餐中或餐後立刻服用。
4. 可攪入果汁、蔬菜汁或牛奶中一起服用。加入飲料後造成輕微的變色不會改變口味或療效。
5. 為了確保正確劑量，瓶身垂直向下，藥劑即會立即滴出。若藥劑未滴出，繼續輕敲瓶底直到藥劑滴出，不要搖晃瓶身。
6. 靜脈輸注與口服鐵劑不建議同時使用，因會抑制口服鐵劑的吸收。
7. 常見副作用為便秘、瀉下、噁心、嘔吐、黑便、胃痛，但

臺北市立

聯合醫院

一般都是短暫發生且不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

8. 懷孕或哺乳期間服用本品須先徵詢過醫師之同意。
9. 請將此滴劑存放於 30°C 以下並避光，且放於小孩不易取得的地方。