

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Dihydroergotoxine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-156

## ☞ 藥品商品名及含量

益利循錠 1.5 毫克/錠 (Elistin)。

好如臨錠 1.5 公絲/錠 (Hodrin)。

## ☞ 藥品作用

本藥可改善腦部血液循環。

## ☞ 服用方式

1. 通常一天 2~3 次，每次口服 1 粒。

2. 建議於用餐前服用。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。

3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是麥角鹼過敏、心率過緩、低血壓、精神疾病。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血壓劑、bromocriptine、dihydroergotamine、血清素活性藥物 (serotonergic drugs)。

3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

4. 常見副作用為低血壓、鼻塞、暈眩、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、心搏變快或變慢、四肢麻木、虛弱，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重心跳過慢、胸悶或胸痛、皮膚出疹/紅斑、呼吸抑制、神智混亂、昏睡、暈眩、痙攣或休克。

6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或哺乳請事先告知醫師。