

藥物成分

劑型

櫃號

Methylphenidate

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-291

☞ 藥品商品名及含量

利長能持續性藥效膠囊 20 毫克 (Ritalin LA)

專思達長效錠 18 毫克 (Concerta ER)

利他能錠 10 毫克 (Ritalin)

思有得持續性藥效膠囊 22 毫克 (Methydrur SR)

思有得持續性藥效膠囊 33 毫克 (Methydrur SR)

☞ 藥品作用

治療注意力不全的過動症狀、發作性嗜睡症。

☞ 服用方式

1. 使用劑量通常每日 1-2 次，每次 1-3 粒。

2. 專思達、利長能、思有得於早上服用，須整粒吞服。

3. 利長能持續性藥效膠囊可剝開膠囊服用，但內粉不可磨碎，或混和高溫食物服用。且為避免干擾睡眠，利他能最後一次服藥時間應於下午六點之前。

4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是焦慮、緊張及情緒激動、青光眼、嚴重心血管疾病、嗜鉻細胞瘤、甲狀腺官能亢進、妥瑞症家族病史或診斷。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是接受單胺氧化酶抑制劑治療期間，或停用未滿十四天。

3. 服藥期間請勿飲酒，酒精會導致藥物耐受性及心理性依賴，伴隨不同程度的異常行為或精神病發作，亦有可能使緩釋劑型藥物發生明顯的劑量傾釋。

4. 常見副作用為鼻咽炎、食慾減退、失眠、噁心嘔吐、體重

下降、抽動、情緒不穩、心悸，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診

5. 若於服藥期間出現過敏反應(皮膚紅疹或是搔癢)，請立即停藥並洽醫師/藥師詢問。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。