



藥物成分  
**Teriparatide**

劑型  
**針劑**

櫃號

版本：TPE202309／流水號：2023-415

## ☞ 藥品商品名及含量

骨穩注射液 250 微克/毫升; 2.4 毫升/支  
(Forteo For Injection)

H 用藥指導短片



## ☞ 藥品作用

用於停經後婦女骨質疏鬆症具高度骨折風險者、男性原發性或次發於性腺功能低下症之骨質疏鬆且具高度骨折風險者、女性及男性因糖化皮質類固醇治療引起之骨質疏鬆症且具高度骨折風險者。

## ☞ 使用方式

建議劑量為每日 1 次，每次 20 微克，皮下注射。

### 1. 準備步驟：

- (1) 請先將雙手洗淨並擦乾。
- (2) 從冰箱拿出注射筆。
- (3) 拔開白色筆蓋，用酒精棉擦拭注射小瓶橡皮塞處。
- (4) 裝上新針頭：撕開針頭標籤，將針頭依順時針方向在注射筆上旋緊，並將針頭外蓋取下且暫勿丟棄。

### 2. 設定劑量：

- (1) 將黑色注射鈕向外拉直到停住。
- (2) 確認黃色筆管及紅色條紋已露出。

### 3. 注射藥劑：

- (1) 取下針頭內蓋並丟棄。
- (2) 選擇施打部位，以下腹部或大腿外側皮膚優先。
- (3) 先以酒精棉消毒施打部位，輕捏起一小塊皮膚，將針頭垂直插入皮膚。
- (4) 以大拇指按壓黑色注射鈕到底，按住不放，從 1 數到 5。
- (5) 將針頭自皮膚拔出，再將黑色注射鈕放開，確認黃色筆管未露出，表示已注射完整劑量。
- (6) 注射後應先裝回針頭外蓋，再旋轉外蓋以取下針頭，

並將針頭丟至醫療回收桶。蓋上白色筆蓋，放回 2~8°C 冰箱中保存。

## 80 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否會對 Teriparatide 過敏。
2. 初次使用本藥可能會發生姿勢性低血壓，您可先坐下或躺下再來使用。
3. 不論是否已開封使用，皆應貯存於 2~8°C 冰箱中，勿冷凍。若須帶著注射筆外出，請將注射筆置於保冰袋。
4. 自第一次注射可連續使用 28 日；超過 28 日後，剩餘殘藥請丟棄。
5. Teriparatide 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法忍受，請盡快告知您的醫師：局部過敏、腸胃道不適、高血壓、高血鈣、關節疼痛等。
6. 孕婦用藥等級：C。若您已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。若您計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。
7. 目前未知 Teriparatide 是否會分泌到母乳中，若您有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。