

藥物成分

劑型

櫃號

Dexlansoprazole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-147

☞ 藥品商品名及含量

得喜胃通緩釋膠囊 60 毫克/膠囊 (Dexilant Delayed Release Capsules)

☞ 藥品作用

1. 治療糜爛性食道炎：12歲以上病患，使用達8週。
2. 維持糜爛性食道炎已治癒後的療效：於成人使用達6個月、12~17歲使用達16週。
3. 非糜爛性胃食道逆流疾病之症狀治療：12歲以上病患，持續4週。

☞ 服用方式

本藥須由醫師處方使用。每天 1 次。如果錯過投藥，應盡快服藥。但如果已屆下一個預定投藥時間，不可再服用錯過的劑量，並準時投與下一個劑量。不可一次服用兩個劑量來彌補錯過的劑量。

☞ 注意事項

1. 必須整粒吞服。請勿咀嚼得喜胃通。
2. 吞嚥膠囊有困難的病人，可與果醬一起服用，請勿咀嚼。膠囊可和開水以口腔注射器或鼻胃(NG)管給予
3. 肝功能不全病人治療糜爛性食道炎(EE)的劑量調整。中度肝功能不全，每天最高劑量為 30 mg 治療 8 週。重度肝功能不全，不建議使用本品。
4. 對得喜胃通配方內的任何成分過敏，則禁止服用。過敏反應可能包括嚴重過敏反應、過敏性休克、血管性水腫、支氣管痙攣、急性腎小管間質性腎炎和蕁麻疹。與含 Rilpivirine 藥物為禁忌。
5. 無法排除胃癌存在的可能性，應考慮額外的追蹤和診斷測試。在老年人病中，還應考慮內視鏡檢查。
6. 接受高劑量(定義為每天多次用藥)的長期 (1 年或更久)

PPI 治療，會使病人發生骨折的風險增高。

7. 若有出現臨床重要副作用/不良反應，請立即洽詢醫師診治：急性腎小管間質性、腎炎困難梭狀桿菌相關腹瀉、骨折、嚴重皮膚不良反應、皮膚及全身性紅斑狼瘡、氰鈷胺(維生素 B12)缺乏症、低鎂血症與礦物質代謝、胃底腺息肉、未滿兩歲兒童病人的心臟瓣膜增厚風險。
8. 常見不良反應：腹瀉、腹痛、噁心、上呼吸道感染、嘔吐、腸胃脹氣。若有發生，請諮詢醫師或藥師。
9. 目前試驗未顯示有懷孕相關的不良反應。
10. 應考慮母乳哺育對嬰兒發育和健康的益處、哺乳婦女對得喜胃通的臨床需求，來決定是否使用。
11. 尚未確立得喜胃通於小於 12 歲兒童病人的療效與安全性。
12. 未滿 2 歲的兒童病人不建議使用得喜胃通。

∞ 藥品儲存

請儲存於 30°C 以下。