



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Dolutegravir / Lamivudine</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-575		

## ☞ 藥品商品名及含量

洛瓦梭膜衣錠 50/300 毫克/錠 (Dovato F.C.)

## ☞ 藥品作用

本藥用於治療成人第一型人類免疫不全病毒(HIV-1)感染症。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，可隨/不隨食物一起整粒吞服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別曾經因 dolutegravir、lamivudine 引起過敏或腎臟疾病、肝臟疾病(如:B 型肝炎)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥物(carbamazepine、oxcarbazepine、phenobarbital、phenytoin)、rifampin、metformin；此外若有使用健康食品、中草藥(聖約翰草)等服用此藥前請先告知醫師。
3. 制酸劑請在服用本藥 2 小時後或 6 小時前服用。
4. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到完全控制病毒複製。
5. 服用此藥並無法阻止病毒經過血液或性行為傳播，請記得確實執行安全性行為，勿共用針頭、牙刷、刮鬍刀等
6. 常見副作用為頭痛、腹瀉、胃部不適、失眠或感到疲倦虛弱等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應如皮膚起水泡、

喉嚨腫脹；肝臟相關如皮膚眼睛發黃、尿液變深；乳酸中毒如呼吸急促、心跳異常；胰腺相關如嚴重胃痛或背痛。

8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示胎兒可能有新生兒神經管缺損的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。