



藥物成分	劑型	櫃號
Oxycodone	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-473		

## ☞ 藥品商品名及含量

奧諾美 5 毫克速效膠囊 Oxycodone 5mg (OxyNorm【#】5mg IR cap)

疼始康定 10 毫克持續藥效錠 Oxycodone 10mg (Oxycontin CR【#】10mg)

## ☞ 藥品作用

疼痛控制

1. 長期疼痛控制之中重度癌症疼痛病人
2. 慢性中重度非癌症疼痛病人，且曾經接受過鴉片類藥物而無法有效控制疼痛者
3. 可耐受鴉片類藥物的年滿 11 歲兒童病人，正以每日最低劑量接受鴉片類藥物(限疼始康定 10 毫克持續藥效錠)

## ☞ 服用方式

1. 請遵照醫師處方之用法及劑量服用，未經醫師同意，切勿自行增加藥量或服藥次數。
2. 需要配以足量的開水，整粒吞服，不要咀嚼、分開膠囊或壓碎錠劑。

## ☞ 注意事項

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。  
當有需要調整劑量時，在未與醫師討論前，請勿停藥
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是鎮靜劑、安眠藥或肌肉鬆弛劑、肝腎功能不全、嚴重呼吸抑制、氣喘、頭部損傷者、慢性肺阻塞疾病、癲癇或疑似麻痺性腸阻塞及腸胃道阻塞。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，避免使用致效/拮抗混合型止痛藥(例如：pentazocine、nalbuphine 及 butorphanol)或部分致效型((例如：buprenorphine)止痛藥。
4. 常見副作用為便秘、噁心、嗜睡、暈眩、搔癢、嘔吐，但

一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、呼吸急促、心跳加快、胸痛、臉部／舌頭／喉嚨腫脹、極度嗜睡、嚴重低血壓(變更姿勢時感到暈眩，或感到即將昏厥)。

## ∞ 其他注意事項

1. 若您計畫懷孕或已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
2. 服藥後可能會讓您感覺嗜睡或血壓降低，在尚未確認您對這類藥物的反應前，請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。
3. 請告知病患，若不再需要使用藥物時，應將未使用的膠囊、藥錠繳回原給藥之醫療院所。