



藥物成分

劑型

櫃號

Prednisolone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-714

☞ 藥品商品名及含量

"柏理"康速龍錠 5 毫克/錠 (Compesolon)

"成大" 普列道寧錠 5 毫克/錠 (Prednisolone)

☞ 藥品作用

類固醇為一種類似腎上腺皮質分泌的荷爾蒙，有強力抗發炎及免疫調節的效果。臨床上可用來消除許多疾病所造成的發炎，詳細用途建議詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 用法用量會因疾病及病人狀況作調整。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺機能不足、重症肌無力症、骨質疏鬆、糖尿病、胃潰瘍、嚴重感染、青光眼、高血壓、腎結石或肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物(包含健康食品)，特別是抗凝血劑 warfarin、aspirin、利尿劑、中藥(甘草)、digoxin、消炎止痛藥、抗癲癇藥或抗生素。
3. 如要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正服此藥。
4. 兒童長期使用請嚴格遵守兒科醫師指示。
5. 若需長期高劑量使用，建議早飯後服用，且不可任意停藥，須按照醫師指示固定服用，要停藥前也需慢慢減量。
6. 若您本身有糖尿病，在開始服用類固醇時請注意血糖變化。

7. 若長期使用，要施打疫苗前請告知醫師。

8. 服用本藥期間建議避免飲酒，以免加重對胃部刺激。

9. 常見副作用：腸胃不適(胃痛)、噁心/嘔吐、水腫、青春痘、月亮臉、水腫、食慾改變、出汗、骨質疏鬆症等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

10. 如果有下列症狀，請立刻就醫：紅疹、嚴重水腫、不明骨骼痛、虛弱/不明感染、黑便、傷口無法癒合、視力變化、憂鬱/焦慮。

11. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請先告知醫師；有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。