



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Sildenafil Citrate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-742		

## ☞ 藥品商品名及含量

威而鋼膜衣錠 100 毫克/錠 (Viagra<sup>®</sup> tablets)

旭立飛膜衣錠 100 毫克/錠 (Shilifil F.C)

威而鋼口溶錠 50 毫克/錠 (Viagra<sup>®</sup> orodispersible tablets)

剛挺口溶錠 50 毫克/錠 (Wellnitin<sup>®</sup> orodispersible tablets)

## ☞ 藥品作用

性刺激下促進陰莖海綿體平滑肌舒張增加血流量，治療成年男性勃起功能障礙。

## ☞ 服用方式

1. 建議約在性行為前 1 到 4 小時視需要服用。最多一日服用一次，每次 25 毫克到 100 毫克，請依據醫師指示服藥，不可自行調整劑量或頻率。
2. 與高油脂食物一起服用時，可能影響藥物吸收，請依照您的臨床反應評估是否需要空腹服用。
3. 若使用口溶劑型，可直接將口溶錠至於口中舌面上，待溶散後再用水送服，或不用水直接吞服。若需服用第二錠 50 毫克口溶錠以達到 100 毫克之劑量的患者，應於第一錠完全溶散後再服用第二錠。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝/腎功能不全、高/低血壓、心血管疾病(特別是心絞痛)、最近曾中風或心肌梗塞、遺傳性視網膜病變。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是硝化甘油、硝酸鹽類藥物如：isosorbide salts、nicorandil，避免產生嚴重低血壓。
3. 某些藥物可能會影響本藥藥效，如 cimetidine、HIV 病毒

的蛋白酶抑制劑、抗黴菌藥等，如看診其他科別醫師時請告知有在服用本藥。

4. 勿過度飲酒易造成低血壓副作用；避免食用大量葡萄柚汁。
5. 常見副作用為頭痛、潮紅、消化不良、鼻血、頭暈、噁心、一隻或兩隻眼睛突然視覺喪失、藍光幻視、畏光、視覺模糊、聽覺暫時喪失或異常(通常為一側耳朵)，應儘量避免操作危險機具或開車。若症狀惡化請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸或心跳過快、胸痛、嚴重暈眩、聽力及視覺異常、勃起時間過長(超過4小時)或勃起異常疼痛、嚴重過敏反應(頭臉腫脹、大範圍紅疹)。
7. 懷孕等級B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。