



藥物成分	劑型	櫃號
Azilsartan	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-530		

☞ 藥品商品名及含量

易得平錠 40 毫克/錠 (Edarbi)

☞ 藥品作用

是一種血管加壓素 II-接受體拮抗劑，作用於腎素-血管收縮素-醛固酮系統，可單一使用或和其他高血壓用藥併用於治療高血壓。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1-2 粒，飯前飯後皆可。
2. 本藥易受光線與水氣影響，請保存在原鋁箔包裝內，使用前才拿出，如果有需要分裝也請連同鋁箔包剪開。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不全、腎動脈狹窄、肝功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是有糖尿病或腎功能不全，且正在服用含 Aliskiren 成分藥品；其他降血壓藥、鋰鹽、非類固醇消炎藥、保鉀利尿劑、鉀補充劑。
3. 常見副作用為暈眩、腹瀉、噁心、疲倦、乾咳、肌肉痙攣、低血壓，一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、搔癢、血管性水腫(如口腔、眼眶、嘴唇周圍水腫)。
5. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。