



藥物成分	劑型	檔號
Bacitracin/ Neomycin/ Polymyxin B	外用 藥膏	
版本：TPE202309／檔號：2023-309		

☞ 藥品商品名及含量

使皮新軟膏 10 克/條 (Spersin)

☞ 藥品作用

緊急處理、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

☞ 使用方式

1. 通常每日 1~3 次，局部清潔後適量塗於患部。
2. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，避免增加副作用。
3. 請依照醫師或藥師指示使用，不可自行增加使用次數。若不慎忘記使用，請立即使用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間塗藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有抗生素藥物過敏或是有其他疾病，特別是對抗生素過敏者、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素類藥品。
3. 本藥品限外用，請勿口服或使用於眼睛四周與黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、龜裂、潰爛及嚴重外傷之患部。
4. 若不慎使藥品誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就診。
5. 請勿塗抹於過大之體表面積(面積不應超過雙掌大小)。
6. 常見副作用為皮膚過敏反應，包含紅腫、搔癢等，但僅

有少數人會發生且一般並不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：使用七天後症狀未改善且發現有更深層皮膚組織感染。
8. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
9. 本藥是否會分泌至母乳尚未有相關研究，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。