



藥物成分	劑型	櫃號
Venetoclax	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-445		

☞ 藥品商品名及含量

唯可來膜衣錠 100 毫克/錠 (Venclexta)

☞ 藥品作用

本藥作用於抗細胞凋亡蛋白，用來治療血球相關癌症，例如慢性淋巴球性白血病 (CLL)、急性骨髓性白血病 (AML)。

☞ 服用方式

- 劑量會在五周內逐步調整增高，依病況而有所不同。
- 請每日固定時間，隨餐完整吞服，不應剝半、攪碎或咀嚼。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
- 如果病人用藥之後嘔吐，當天不可再補服另一顆錠劑，應根據正常服藥時間，隔天再服藥。

☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全患者。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強效 CYP3A4 抑制劑: Clarithromycin、Erythromycin、Diltiazem、Itraconazole、Ketoconazole、Ritonavir、Verapamil 或是強效 CYP3A4 誘導劑: Carbamazepine、Phenobarbital、Phenytoin、Rifampin。
- 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
- 服藥前兩天前起及服藥療程期間，每天需喝 1.5-2 公升水，以降低腫瘤溶解症候群(TLS)的風險。
- 可能的藥物副作用：咳嗽、上呼吸道感染、發燒、疲勞、發燒、噁心嘔吐、水腫、低血壓、肌肉疼痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：貧血、白血球低下、肺炎、血小板低下、出血、**腫瘤溶解症候群(TLS)症狀(如嘔吐、肌肉抽筋、手足抽搐、昏厥、心律不整)**。
7. 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。
8. 服藥期間應避免施打活性減毒疫苗，如水痘疫苗、麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗、活性減毒型帶狀疱疹疫苗 Zostavax。
9. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有傷害胎兒的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。