

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Potassium Citrate/  
Citric Acid**

**口服藥**

版本：TPE202309／檔號：2023-357

## ☞ 藥品商品名及含量

淨石顆粒 5 克/包 (Crashtone granules)

結石清 5 克/包 (K-Citrate)

## ☞ 藥品作用

全身性的鹼化劑，使尿液維持鹼性狀態，防止結石形成。

## ☞ 服用方式

1. 通常一天四次，每次一包，飯前或睡前服用。
2. 本藥含高濃度鉀離子，需以 180 毫升冷開水或果汁混勻稀釋再服用，減少對腸胃道傷害，不可直接服用顆粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是活動性尿路感染、消化性潰瘍、腎功能不全、高血鉀症。
2. 淨石顆粒含阿斯巴甜，苯酮尿症患者不宜使用。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是留鉀性利尿劑(spironolactone、triamterene、amiloride)或其他含鉀之製劑。
4. 服藥期間，請定期監控電解質、腎功能。
5. 常見副作用為輕微腸胃不適，如腹痛、噁心、嘔吐或輕瀉，建議服用大量水、隨餐或餐後服用藥物，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀 請立刻就醫：嚴重嘔吐、腹痛或胃腸出



7. 女性哺乳、計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。