



藥物成分

劑型

櫃號

Rabeprazole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-723

## ☞ 藥品商品名及含量

百抑潰腸溶膜衣錠衣錠 20 毫克/錠 (Pariet)

胃潰樂腸溶膜衣錠 20 毫克/錠 (Rabett)

## ☞ 藥品作用

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌相關的消化性潰瘍、胃食道逆流疾病之治療。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 藥品應在每日早飯前半小時服用。不宜嚼碎或壓碎，需整粒吞服。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是其他質子幫浦抑制劑、胃或食道惡性腫瘤。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 rilpivirine、digoxin、nelfinavir、erlotinib、mycophenolate mofetil。
3. 長期使用(超過三個月)此藥易引起低血鎂，可能無症狀或出現嚴重不良反應症狀，包括手足抽搐、心律不整、癲癇發作等。
4. 請讓醫師評估您是否有骨質疏鬆風險，因此藥會減少胃酸分泌，進而降低維他命 B12 的吸收。長期使用(超過一年)容易有維他命 B12 缺乏以及骨質疏鬆的疑慮。
5. 常見副作用為頭痛、腸胃道不適、無力、發疹和口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：癲癇、頭暈、心悸或心跳異常、顫抖、肌肉無力。

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥可能會分泌到母乳裡(目前臨床資料不足)，服藥期間不建議哺乳。