



藥物成分	劑型	櫃號
Rasagiline	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-725		

## ☞ 藥品商品名及含量

阿茲列特錠 1 毫克/錠 (Azilect)

律莎錠 1 毫克/錠 (Rakinson)

## ☞ 藥品作用

本藥品可單獨治療或輔助治療原發性帕金森氏症 (Parkinson's disease)

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。
2. 可單獨使用或與食物併用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗憂鬱藥、單胺氧化酶抑制劑、含 Meperidine 等成分之止痛劑或含 Dextromethorphan 等成分之鎮咳藥物。
3. 服藥期間應避免食用含有大量酪胺(Tyramine)的食品(例如：起士、乳酪、紅酒)。
4. 常見副作用為頭痛、憂鬱、暈眩和流感(流行性感冒和鼻炎)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫回診：日間昏昏欲睡、嗜睡過度。
7. 不排除此藥物是否具有致畸胎，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。