



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Neostigmin Methylsulfate</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-314		

## ☞ 藥品商品名及含量

**硫酸甲酯新斯狄明點眼液 0.01% (O.N.S.D)**

**護眼眼藥水 0.01% (Eyehelp eye drops)**

## ☞ 藥品作用

本藥為副交感神經作用劑，可作用在神經和肌肉接合部位，改善眼球肌肉症狀，減緩眼睛疲勞。

## ☞ 使用方式

1. 每日3次，每次2滴，滴於患處。
2. 若同時使用兩種以上之眼用藥，請先用藥水再用藥膏，並間隔5分鐘。
3. 使用本產品應於點眼15分鐘後再配戴隱形眼鏡。
4. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 常見副作用為眼睛灼熱、刺激感、短暫性視覺干擾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 室溫避光保存，開封4週後，未用完之殘藥請丟棄。