

藥物成分

劑型

櫃號

Codeine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-807

☞ 藥品商品名及含量

磷酸可待因錠 15 毫克/錠 (Codeine Phosphate 15 mg)

磷酸可待因錠 30 毫克/錠 (Codeine Phosphate 30 mg)

☞ 藥品作用

1. 鎮咳作用：磷酸可待因與嗎啡同樣可抑制延髓之咳嗽中樞。
2. 鎮痛作用：磷酸可待因具中樞性鎮痛作用。
3. 止瀉作用：磷酸可待因具強效止瀉作用。

☞ 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 本品用於兒童，僅限臨床效益大於風險時使用。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有**藥物過敏**或是有**其他疾病**，像是**甲狀腺機能低下**、**嚴重呼吸抑制**、**氣喘發作**、**肝腎功能異常**、**慢性肺部疾病併有心臟功能不全**、**痙攣狀態**及**急性酒精中毒**等。請告訴醫師或藥師您是否有在**服用其他藥物**，特別是**鎮靜安眠類藥品**、**單胺氧化酶抑制劑**、**中樞神經抑制劑**或**抗憂鬱類**等相關精神方面的藥品。
2. 可能產生**藥物依賴性**，須由醫師處方使用。
3. 如果連續服用一段期間之後要停藥請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀，引發呵欠、噴嚏、流淚、噁心、嘔吐、頭痛、失眠、震顫、全身肌肉關節痛、呼吸急迫等戒斷症狀。
4. **請勿飲用酒類**，酒精會增強此藥物的鎮靜作用。

5. 本藥可能會讓人暈眩、嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮腫脹)、呼吸抑制(呼吸變慢、變淺)。
7. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間應避免哺乳。