

藥物成分

劑型

編號

Fluticasone furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol

乾粉吸 入劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-219

☞ 藥品學名及含量

肺樂喜易利達乾粉吸入劑 92 及 55 及 22 微克/每劑 (Trelegy Ellipta)



肺樂喜教學影片




☞ 藥品作用

氣喘、支氣管肺炎、慢性阻塞性肺病。一般作為氣喘維持治療。


☞ 使用方式

通常每日相同時間1次，每次1下。




圖一

撕開封蓋來打開藥盒
(裡面有 1 包不可食用的乾燥劑)




圖四

滑開吸口蓋至聽到
「卡搭」聲，即完成
一次劑量之填充




圖五

先向旁邊盡量吐氣
(不可對吸嘴吐氣)




圖六

嘴巴含住吸口，以長而穩定的方式深吸一口氣
(深吸目的是要讓藥粉進入肺部深處，達到良好的治療效果)



圖八

閉住氣至少 3-4 秒
鐘



圖九

慢慢吐氣後，將吸口蓋蓋上

注意事項

1. **重要：請不要在非給藥時間滑開吸口蓋，一但滑開吸口蓋又關上而沒吸藥，會浪費該劑量無法再次使用。**
2. **每 24 小時不可使用超過一次。**請依醫師指示用藥，不可自行調整劑量。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補服而使用雙倍劑量。
3. **本藥不適用於緩解急性支氣管痙攣。**
4. **每次使用完吸入劑必須以清水漱口且不可吞下，藉以幫助降低發生口咽念珠菌病的風險。**
5. 本藥含有吸入性類固醇可能影響免疫功能，若所在地區有暴露水痘/麻疹的風險請諮詢醫師。
6. 本品禁用於有嚴重乳蛋白過敏問題的患者，或已證實對成分或任何賦形劑過敏的患者。
7. 常見副作用為心悸、頭痛、上呼吸道感染增加，口腔念珠菌感染等，但一般都不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀請立刻就醫：**水腫/皮疹(過敏)、心律不整/嚴重心悸、視力變化(模糊/疼痛)、支氣管痙攣、無法排尿。**
9. 現有證據對孕婦使用時胎兒風險不明確，本藥可能會分泌到母乳裡，女性計畫懷孕/哺乳或已懷孕請諮詢醫師/藥師。

清潔方式

請用乾面紙或布清潔吸口，不能用水清洗或放入水中。

儲存方式

室溫 30°C 以下儲存，自鋁箔藥盒取出後可存放一個月。

如何觀測剩餘藥量

吸入劑瓶身有一個剩餘劑量的視窗，共含有 30 劑，當藥劑剩下小於 10 劑時，計數器左邊會呈現紅色。

