



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|--------------------------|------------|----|
| Doxazosin | 口服藥 | |
| 版本：TPE202309／櫃號：2023-577 | | |

☞ 藥品商品名及含量

可迅持續性藥效錠 4 毫克/錠 (Doxaben XL)

可迅錠 2 毫克/錠 (Doxaben)

漢薩心持續性藥效錠 4 毫克 (Haxasin XL Tablets 4mg)

☞ 藥品作用

控制高血壓，主要作用使血管肌肉鬆弛擴張，使血液在血管順暢流通以達降壓目的。良性前列腺肥大，主要作用使膀胱及前列腺附近的平滑肌鬆弛，讓尿液順利排出，緩解尿急及頻尿感。

☞ 服用方式

1. 通常每日一次每次 1 粒，需每日固定時間服用。
2. 持續錠不可嚼碎、分割或磨碎藥錠。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 boceprevir、asenapine、vardenafil、sotalol、sildenafil。
3. 第一次服用本品可能會感到暈眩，宜平躺至少 1 小時，建議於睡前服用。
4. 常見副作用為頭痛、頭暈、疲勞，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸、心跳不規則、造血功能異常、肝炎、陰莖異常勃起。**
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。