



藥物成分	劑型	櫃號
Ivabradine	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-639		

## ☞ 藥品商品名及含量

康立來膜衣錠 5 毫克/錠 (Coralan F.C. Tablets)

立舒心膜衣錠 5 毫克/錠 (Ivaheart F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

延緩心跳，用於治療慢性心衰竭。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒，隨餐服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重低血壓(血壓 $<90/50$ mmHg)、先天性 QT 延長症候群。
2. 本藥物含有乳糖，若有罕見遺傳性半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良的患者請先諮詢醫師。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌劑(Ketoconazole、Itraconazole)、Macrolide 抗生素(Clarithromycin、口服 Erythromycin、Josamycin、Telithromycin)、HIV 蛋白抑制劑(Nelfinavir、Ritonavir) 與 Nefazodone、Diltiazem、Verapamil。
4. 服藥期間請避免飲用葡萄柚汁。
5. 常見副作用為頭痛、發光現象(光幻覺)與心跳緩慢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 動物研究指出會分泌到乳汁中，並有繁殖毒性、胚胎毒性及致畸胎性作用，在懷孕期間禁止使用且不可哺乳。